



VIDENSRÅD
FOR
FOREBYGGELSE

Hvem er i særlig risiko for at udvikle et problematisk alkoholforbrug?

Mads Uffe Pedersen

Professor

Center for Rusmiddelforskning

Aarhus Universitet

AUDIT konsekvenser

- Hvor ofte drikkes
 - Genstande typisk når der drikkes
 - Binge druk – hvor ofte
-
- Ikke holde op
 - Ikke gjorde ting der blev forventet
 - Behov drikke om morgen
 - Skyldfølelse/fortrudt druk
 - Ude af stand til at huske
 - Kommet til skade
 - Andre bekymret over forbrug

AUDIT konsekvenser

- Hvor ofte
 - Genstande typisk når der drikkes
 - Binge druk – hvor ofte
-
- Ikke holde op
 - Ikke gjorde ting der blev forventet
 - Behov drikke om morgen
 - Skyldfølelse/fortrudt druk
 - Ude af stand til at huske
 - Kommet til skade
 - Andre bekymret over forbrug

Skelne mellem...

- Moderate alkoholproblemer
(score 8-15)
- Udtalte alkoholproblemer
(score 16+)

AUDIT konsekvenser

- Hvor ofte
 - Genstande typisk når der drikkes
 - Binge druk – hvor ofte
-
- Ikke holde op
 - Ikke gjorde ting der blev forventet
 - Behov drikke om morgen
 - Skyldfølelse/fortrudt druk
 - Ude af stand til at huske
 - Kommet til skade
 - Andre bekymret over forbrug

- Scores between 8 and 15 are most appropriate for simple advice focused on the reduction of hazardous drinking.
- Scores between 16 and 19 suggest brief counseling and continued monitoring.
- AUDIT scores of 20 or above clearly warrant further diagnostic evaluation for alcohol dependence.

Skelne mellem...

- Moderate alkoholproblemer (score 8-15)
- Udtalte alkoholproblemer (score 16+)

To typer problematikker

Risikoadfærd

Eksternalisering

- Problematisk alkoholforbrug (AUDIT16+)
- Cigaretter
- Hash
- Andre illegale stoffer
- ADHD
- Kriminalitet

- Flere mænd

Mistrivsel

Internalisering

- Håndkøbsmedicin
- Ordineret medicin
- Fysiske problemer
- Mobbet
- Anden diagnose end ADHD/adfærds-diagnoser (ex depression, angst mm)

- Flere kvinder



ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

Addictive Behaviors

journal homepage: www.elsevier.com/locate/addictbeh



Mapping risk factors for substance use: Introducing the YouthMap12

Mads Uffe Pedersen *, Kristine Rømer Thomsen, Michael Mulbjerg Pedersen, Morten Hesse

Centre for Alcohol and Drug Research, School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Denmark



Eksternaliserende problemer og jævnligt forbrug af cigaretter, stoffer og alkohol

Score		Cannabis	Andre ill-	Alkohol
Ekstern.	Cigaretter	1+dage	gale stoffer	problemer
problemer	Personer	dagligt	Sidste måned	16+ score*
0	1.926	6,70	6,28	1,45
1	601	15,31	11,65	4,33
2	213	28,64	18,78	6,10
3	148	38,51	21,62	6,08
4	84	35,71	23,81	11,90
5	75	54,67	21,33	12,00
6	17	70,59	45,29	29,41
	3.064	13,77	9,95	3,26

Eksternaliserende problemer og jævnligt forbrug af cigaretter, stoffer og alkohol

Score	Cannabis	Andre ill-	Alkohol		
Ekstern. problemer	Cigaretter	stoffer	problemer		
Personer	dagligt	1+dage	16+ score*		
0			1,45		
1			4,33		
2			6,10		
3			6,08		
4		23,81	11,90		
5	15	54,67	21,33	18,67	12,00
6	17	70,59	45,29	35,29	29,41
	3.064	13,77	9,95	2,48	3,26

**Det svarer til...
at 28.700 unge har været årsag til de
selv/eller andre er kommet til skade
pga den unges alkoholforbrug, **den**
seneste måned**

Eksternaliserende problemer og jævnligt forbrug af cigaretter, stoffer og alkohol

Score	Personer	Cigaretter dagligt	Cannabis 1+dage Sidste m ^o	Andre ill- gale stoffer ned	Alkohol problemer 16+ score*
0	1.026				1,45
1					4,33
2					6,10
3				5,41	6,08
4		55,71	23,81	9,52	11,90
5	75	54,67	21,33	18,67	12,00
6	17	70,59	45,29	35,29	29,41
	3.064	13,77	9,95	2,48	3,26

Det svarer til...
 at 35.300 unge månedlig oplever ikke
 at kunne huske hvad der skete på
 grund af deres alkoholforbrug

Forældre med alkoholproblemer

Forældres misbrug og den unges misbrug

	Ingen n =5.047	Ja mindst 1 n = 712	AOR
Cigaretter dagligt	11.2	28.7	***2.93
Cannabis 10+ dage	2.3	7.4	***3.51
Cannabis 20+ dage	1.5	4.9	***3.63
Andre illegale stoffer sidste måned	2.4	6.9	***3.12
Alkohol AUDIT 16+	2.9	5.8	**2.05

Kontrolleret for køn og alder

p<0.01, *p<0,001

Problemer med alkohol

Mellem det personlige og sociale

Risikoadfærd har en tendens til at klynge sammen

Man kan med andre ord forestille sig, at unge der har **personlige** problemer (eksternalisering/forældre misbrug) , som kommer fra hjem hvor der drikkes en del alkohol, - er på en arbejdsplads eller et uddannelsessted med en kultur med et udpræget stort forbrug af alkohol/ alkohol-festkultur **i særlig grad er i risiko for at udvikle et udtalt problematisk forbrug af alkohol (og andre rusmidler), som har klare konsekvenser.**

Endelig kan man også forestille sig en gruppe af unge, hvor et stort forbrug af alkohol helt primært kan forklares af de **sociale** sammenhænge, som den unge aktuelt færdes i. **De fleste af disse unge vil antageligt reducere deres forbrug, når de skifter miljø.**

Tak for opmærksomheden



CENTRE FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
AND BEHAVIOURAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

17 JANUARY 2019

MADS UFFE PEDERSEN
PROFESSOR

